

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 22-5-74 751864

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

55 Rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

Tél. 60-95-87 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL : 30 F

C. C. P. LYON 9431-17

Régisseur Avances et Recettes D. D. A.

55, Rue Mazenod — 69 — LYON-3*

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

Bulletin N° 9 (nouvelle série)

15 mai 1974

V I G N E

MILDIOU - Les pluies prolongées généralisées et relativement tièdes des 10 et 11 mai ont été très favorables aux premières contaminations importantes. Les premières taches devant apparaître vers le 19 mai, un traitement devra être appliqué avant cette date. Mais aucun foyer primaire n'étant à ce jour décelable, ce traitement n'est encore nécessaire que dans les situations où ces premiers foyers apparaissent ordinairement.

BLACK-ROT - L'incubation du black-rot étant beaucoup plus longue que celle du mildiou, la protection contre les premiers repiquages devra se situer seulement entre le 22 et le 25 mai et seulement dans les vignes où des taches sont déjà apparues et en règle plus générale, à proximité des vignes abandonnées.

OIDIUM - Avec le retour de températures plus élevées, la protection devra être particulièrement soignée sur cépages sensibles.

PYRALE - La présence de chenilles de pyrale est observée dans divers secteurs du Beaujolais; les jeunes chenilles sont vulnérables aux divers insecticides alors que plus âgées elles deviennent beaucoup plus difficiles à détruire. On pourra utiliser l'un des insecticides suivants: acéphate à 100 g. matière active /hl, méthomyl à 62,5 g. m.a./hl, ou mévinphos 50g/hl.

VERS DE LA GRAPPE - Dans les régions les plus précoces, le premier traitement préventif n'est pas à prévoir avant le 22 mai. Au cas où aucun bulletin ne paraîtrait d'ici là, ce traitement appliqué du 22 au 25 mai concernera les zones suivantes:

- Ardèche et Drôme: jusqu'à une altitude de 250 à 350m. suivant les expositions
- Bordure Rhodanienne de la Loire, Rhône, Ain, Savoie et Isère jusqu'à 200 ou 300m suivant exposition
- Reste de la Loire et Hte Savoie: ultérieurement.

Avec les produits à action en profondeur, il pourra être appliqué de 4 à 8 jours plus tard suivant la température de la dernière semaine du mois.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES - Actuellement se chevauchent les dernières contaminations primaires et, principalement dans le sud de la région, les premières contaminations secondaires. En conséquence, la protection devra être partout maintenue, particulièrement à l'approche du 26 mai, date probable d'apparition des taches issues des contaminations généralisées des 10 et 11 mai.

BACTERIOSE DU NOYER - La protection doit être maintenue jusqu'à la chute des chatons. En outre dans les secteurs ayant souffert des gelées d'avril la végétation nouvelle devra être spécialement protégée.

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHEUR - En pépinières et sur arbres en formation seulement.

Dans toute la zone de culture du pêcher, un premier traitement sera appliqué avant le 22 mai.

.../

P189

CARPOCAPSE - Le premier traitement n'est encore à envisager que dans la région 131 et seulement entre le 26 et le 29 mai sur les seules plantations où les fruits sont très peu nombreux.

MOUCHE DE LA CERISE - Des éclosions nombreuses sont déjà observées dans de nombreux secteurs, de sorte qu'en toutes régions, le traitement devra être effectué dès que le fruit sera franchement jaune.

CULTURES DIVERSES

MILDIU DE LA POMME DE TERRE - Les premiers foyers sont apparus dans la vallée du Rhône à la suite des pluies du 3 mai, des repiquages ont pu se produire pendant les précipitations plus tièdes du 10 au 13 de sorte qu'un premier traitement s'impose dans toutes les situations abritées situées au-dessous de 160m. d'altitude.

L'Ingénieur d'Agronomie chargé
des Avertissements agricoles
P.LATARD

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription
A.PITHIoud

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes.
Directeur-gérant: L.BOUYX